

Abituraufgaben bis 2020 Baden-Württemberg

Geraden, Ebenen, Abstand

allgemeinbildende Gymnasien

Alexander Schwarz

www.mathe-aufgaben.com

Februar 2021

Aufgabe 1: (Abiturprüfung 2020)

Gegeben sind die Ebenen $E: 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 6$ und $F: 2x_2 + x_3 = 4$.

- Stellen Sie die beiden Ebenen in einem gemeinsamen Koordinatensystem dar.
- Bestimmen Sie eine Gleichung der Schnittgeraden der beiden Ebenen.
- Berechnen Sie den Abstand des Punktes $O(0|0|0)$ von der Ebene E .

Aufgabe 2: (Abiturprüfung 2020)

Eine Gerade ist orthogonal zur Ebene $E: x_1 - x_3 = 5$ und schneidet die x_1 -Achse in einem Punkt, der vom Punkt $P(0|2|1)$ den Abstand 3.

Bestimmen Sie eine Gleichung einer solchen Geraden.

Aufgabe 3: (Abiturprüfung 2019)

Gegeben sind die Gerade $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$ und die Ebene $E: 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 14$.

- Untersuchen Sie die gegenseitige Lage von g und E .
- Die Gerade h entsteht durch Spiegelung der Gerade g an der Ebene E .
Bestimmen Sie eine Gleichung von h .

Aufgabe 4: (Abiturprüfung 2019)

Gegeben ist die Gerade $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

- Berechnen Sie die Koordinaten des Punktes, in dem g die x_2x_3 -Ebene schneidet.
- Bestimmen Sie den Abstand des Punktes $P(-3|-1|7)$ von der Geraden g .

Aufgabe 5: (Abiturprüfung 2018)

Gegeben sind die Ebenen $E: 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 5$ und die Gerade $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ a \end{pmatrix}$.

Die Gerade g liegt in E .

- Bestimmen Sie die Werte für a und b .
- Geben Sie eine Gleichung einer Geraden h an, die ebenfalls in E liegt und senkrecht zur Geraden g verläuft.

Aufgabe 6: (Abiturprüfung 2018)

Gegeben ist die Ebene $E: x_1 + 2x_2 - x_3 = 4$.

- a) Begründen Sie, dass die Spurpunkte von E die Ecken eines gleichschenkligen Dreiecks bilden.

b) Die Ebene $F: \vec{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ schneidet die Ebene E .

Bestimmen Sie eine Gleichung der Schnittgeraden.

Aufgabe 7: (Abiturprüfung 2017)

Gegeben sind die Ebenen $E: x_1 + 3x_2 = 6$ und $F: \left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$.

- c) Stellen Sie die Ebene E in einem Koordinatensystem dar.
 d) Bestimmen Sie eine Gleichung der Schnittgeraden von E und F .
 e) Ermitteln Sie eine Gleichung einer Geraden, die in E enthalten ist und mit F keinen Punkt gemeinsam hat.

Aufgabe 8: (Abiturprüfung 2016)

Gegeben ist die Gerade $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- a) Untersuchen Sie, ob es einen Punkt auf g gibt, dessen drei Koordinaten identisch sind.
 b) Die Gerade h verläuft durch $Q(8/5/10)$ und schneidet g orthogonal.
 Bestimmen Sie eine Gleichung von h .

Aufgabe 9: (Abiturprüfung 2016)

Gegeben ist die Ebene $E: 4x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 28$.

Es gibt zwei zu E parallele Ebenen F und G , die vom Ursprung den Abstand 2 haben.
 Bestimme jeweils eine Gleichung von F und G .

Aufgabe 10: (Abiturprüfung 2015)

Gegeben ist die Ebene $E: 4x_1 + 3x_3 = 12$.

- a) Stellen Sie E in einem Koordinatensystem dar.
 b) Bestimmen Sie alle Punkte der x_3 -Achse, die von E den Abstand 3 haben.

Aufgabe 11: (Abiturprüfung 2015)

Gegeben sind die drei Punkte $A(4/0/4)$, $B(0/4/4)$ und $C(6/6/2)$.

- Zeigen Sie, dass das Dreieck ABC gleichschenkelig ist.
- Bestimmen Sie die Koordinaten eines Punktes, der das Dreieck ABC zu einem Parallelogramm ergänzt. Veranschaulichen Sie durch eine Skizze, wie viele solcher Punkte es gibt.

Aufgabe 12: (Abiturprüfung 2014)

Gegeben sind die Ebenen $E: x_1 + x_2 = 4$ und $F: x_1 + x_2 + 2x_3 = 4$.

- Stellen Sie die beiden Ebenen in einem gemeinsamen Koordinatensystem dar. Geben Sie eine Gleichung der Schnittgeraden von E und F an.
- Die Ebene G ist parallel zur x_1 -Achse und schneidet die x_2x_3 -Ebene in derselben Spurgeraden wie die Ebene F. Geben Sie eine Gleichung der Ebene G an.

Aufgabe 13: (Abiturprüfung 2014)

Gegeben sind die Punkte $A(1/10/1)$, $B(-3/13/1)$ und $C(2/3/1)$.

Die Gerade g verläuft durch A und B.

Bestimmen Sie den Abstand des Punktes C von der Geraden g.

Aufgabe 14: (Abiturprüfung 2013)

Gegeben sind die beiden Ebenen

$$E_1: 2x_1 - 2x_2 + x_3 = -1 \quad \text{und} \quad E_2: \vec{x} = \begin{pmatrix} 7 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Zeigen Sie, dass die beiden Ebenen parallel zueinander sind.

Die Ebene E_3 ist parallel zu E_1 und E_2 und hat von beiden Ebenen denselben Abstand.

Bestimmen Sie eine Gleichung der Ebene E_3 .

Aufgabe 15: (Abiturprüfung 2013)

Die Gerade g verläuft durch die Punkte $A(1/-1/3)$ und $B(2/-3/0)$.

Die Ebene E wird von g orthogonal geschnitten und enthält den Punkt $C(4/3/-8)$.

Bestimmen Sie den Schnittpunkt S von g und E.

Untersuchen Sie, ob S zwischen A und B liegt.

Aufgabe 16: (Abiturprüfung 2012)

$$\text{Gegeben sind die Ebene } E: \left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = 0 \quad \text{und} \quad F: x_2 + 2x_3 = 8.$$

Bestimmen Sie eine Gleichung der Schnittgeraden.

Aufgabe 17: (Abiturprüfung 2012)

Gegeben sind der Punkt A(1/1/3) und die Ebene E: $x_1 - x_3 - 4 = 0$.

- a) Welche besondere Lage hat E im Koordinatensystem ?
- b) Der Punkt A wird an der Ebene E gespiegelt.
Bestimmen Sie die Koordinaten des Bildpunktes.

Aufgabe 18: (Abiturprüfung 2011)

Gegeben sind die Ebene E: $\left[\vec{x} - \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} = 0$ und die Gerade g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ -7 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- a) Zeigen Sie, dass E und g parallel zueinander sind.
- b) Bestimmen Sie den Abstand von E und g.

Aufgabe 19: (Abiturprüfung 2010)

Gegeben sind die Punkte A(2/4/1), B(0/2/-1), C(4/-2/1) und D(-1/9/0).
Überprüfen Sie, ob dieser vier Punkte in einer Ebene liegen.

Aufgabe 20: (Abiturprüfung 2010)

Gegeben sind die Ebene E: $3x_1 - 4x_3 = -7$ und der Punkt P(9/-4/1).

- a) Berechnen Sie den Abstand des Punktes P von der Ebene E.
- b) Der Punkt S(-1/1/1) liegt auf E.
Bestimmen Sie den Punkt Q auf der Geraden durch S und P, der genauso weit von E entfernt ist wie P.

Aufgabe 21: (Abiturprüfung 2009)

Gegeben sind die Ebene E: $x_1 + x_2 = 4$ und die Gerade g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

- a) Veranschaulichen Sie die Ebene E in einem Koordinatensystem.
- b) Untersuchen Sie die gegenseitige Lage von g und E.
- c) Bestimmen Sie den Abstand des Ursprungs von der Ebene E.

Aufgabe 22: (Abiturprüfung 2008)

Gegeben sind die zwei parallelen Geraden g und h durch

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 9 \\ 4 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ -8 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad s, t \in \mathbb{R}$$

Bestimmen Sie den Abstand der beiden Geraden.

Aufgabe 23: (Abiturprüfung 2008)

Die Ebene E geht durch die Punkte A(1,5/0/0), B(0/3/0) und C(0/0/6).

Untersuchen Sie, ob die Gerade g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ $t \in \mathbb{R}$ parallel zur Ebene E verläuft.

Aufgabe 24: (Abiturprüfung 2007)

Gegeben sind die Ebenen E und F mit

$$E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad r, s \in \mathbb{R} \quad F: \left(\vec{x} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$$

Zeigen Sie, dass die Ebenen E und F parallel sind.

Bestimmen Sie den Abstand der Ebenen.

Aufgabe 25: (Abiturprüfung 2006)

Gegeben sind die Ebene E: $-2x_1 + x_2 - 2x_3 + 15 = 0$ und

die Gerade g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -16 \\ 2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ mit $t \in \mathbb{R}$

a) Zeigen Sie, dass g zu E parallel ist.

b) Bestimmen Sie den Abstand der Geraden g von der Ebene E.

Aufgabe 26: (Abiturprüfung 2006)

Gegeben sind die Ebenen $E_1: 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 12$ und $E_2: 3x_1 + 2x_2 = 6$.

Stellen Sie die beiden Ebenen in einem Koordinatensystem dar.

Zeichnen Sie die Schnittgerade der beiden Ebenen ohne weitere Rechnung ein.

Aufgabe 27: (Abiturprüfung 2005)

Ermitteln Sie eine Koordinatengleichung der Ebene, die den Punkt $A(2/-1/-2)$ und die Gerade

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; t \in \mathbb{R} \text{ enthält.}$$

Aufgabe 28: (Abiturprüfung 2004)

Gegeben sind die Gerade g und die Ebene E durch $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}; t \in \mathbb{R}$

und $E: 4x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 11$.


Prüfen Sie nach, ob der Punkt $A(3/0/2)$ auf der Geraden g liegt.

Zeigen Sie: Die Gerade g ist orthogonal zur Ebene E .

Bestimmen Sie die Koordinaten desjenigen Punktes der Ebene E , welcher vom Punkt A den kleinsten Abstand hat.

Aufgabe 29: (Abiturprüfung 2004)

Ermitteln Sie eine Koordinatengleichung der dargestellten Ebene.




Lösungen**Aufgabe 1:**

a) Berechnung der Spurpunkte der Ebenen (Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen):

$$\text{Spurpunkte der Ebene E: } S_1(3|0|0) \quad S_2(0|3|0) \quad S_3(0|0|6)$$

$$\text{Spurpunkte der Ebene F: } S_2(0|2|0) \quad S_3(0|0|4)$$

Die Ebene F ist parallel zur x_1 -Achse.



b) Gleichung der Schnittgeraden:

Zu lösen ist folgendes lineares Gleichungssystem:

$$2x_1 + 2x_2 + x_3 = 6$$

$$2x_2 + x_3 = 4$$

Setze $x_2 = t$, $t \in \mathbb{R}$

Aus der 2. Zeile folgt: $x_3 = 4 - 2t$

Aus der 1. Zeile folgt: $2x_1 + 2t + 4 - 2t = 6 \Rightarrow x_1 = 1$

$$\text{Gleichung der Schnittgeraden: } g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ t \\ 4 - 2t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

c) Abstand des Punktes $O(0|0|0)$ von E:

$$\text{Hessesche Normalenform von E: } \frac{2x_1 + 2x_2 + x_3 - 6}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2}} = 0 \quad \text{bzw.} \quad \frac{2x_1 + 2x_2 + x_3 - 6}{3} = 0$$

$$\text{Einsetzen des Punktes } O(0|0|0): d = \left| \frac{2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 0 - 6}{3} \right| = 2$$

Aufgabe 2:

Die Ebene E besitzt den Normalenvektor $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

Da die Gerade g orthogonal zur Ebene verläuft, besitzt sie den Richtungsvektor $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

(oder ein Vielfaches davon).

Gesucht ist ein Punkt A(c | 0 | 0) auf der x_1 -Achse, der vom Punkt P(0|2|1) den Abstand 3 hat.

Bedingung: $|\overline{PA}| = 3$

$$|\overline{PA}| = \left| \begin{pmatrix} c-0 \\ 0-2 \\ 0-1 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{c^2 + 4 + 1} = \sqrt{c^2 + 5}$$

$$\sqrt{c^2 + 5} = 3 \quad | \text{quadrieren}$$

$$c^2 + 5 = 9 \Rightarrow c^2 = 4 \Rightarrow c = \pm 2$$

Mögliche Punkte auf der x_1 -Achse sind A(2|0|0) oder A*(-2|0|0).

$$\text{Mögliche Geradengleichung: } g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{oder} \quad g: \vec{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 3:

a) Gegenseitige Lage von g und E:

Berechnung eines möglichen Schnittpunktes von g und E:

$$\begin{aligned} 3 \cdot (2 + t) - 2 \cdot 0 + (1 - 3t) &= 14 \\ \Rightarrow 6 + 3t + 1 - 3t &= 14 \Rightarrow 7 = 14 \end{aligned}$$

Da die Gleichung keine Lösung besitzt, schneiden sich g und E nicht.
Die Gerade und die Ebene sind parallel und haben keine gemeinsamen Punkte.

b) Die Gerade g ist parallel zur Ebene E.

Die gespiegelte Gerade h hat somit denselben Richtungsvektor wie g.

Um einen Punkt der Geraden h zu ermitteln, muss ein Punkt von g an der Ebene E gespiegelt werden.

Spiegelung des Geradenpunktes $P(2|0|1)$ an der Ebene E :

Hilfsgerade durch P , die senkrecht auf E steht: $k: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Schnittpunkt von k mit E : $3 \cdot (2 + 3s) - 2 \cdot (-2s) + (1 + s) = 14$

$$\Rightarrow 6 + 9s + 4s + 1 + s = 14 \Rightarrow 14s = 7 \Rightarrow s = 0,5$$

Einsetzen von $s = 0,5$ in die Gerade k ergibt den Lotfußpunkt $L(3,5 | -1 | 1,5)$

Berechnung des Spiegelpunktes P^* : $\overrightarrow{OP^*} = \overrightarrow{OP} + 2 \cdot \overrightarrow{PL} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1,5 \\ -1 \\ 0,5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$

Der gespiegelte Punkt hat die Koordinaten $P^*(5|-2|2)$.

Die gespiegelte Gerade h hat die Gleichung $k: \vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$

Aufgabe 4:

a) Der Schnittpunkt der Gerade g mit der x_2x_3 -Ebene hat die Koordinaten $A(0 | x_2 | x_3)$.

$$\begin{pmatrix} 0 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Es gilt } 4 + t = 0 \Rightarrow t = -4$$

$$\text{Daraus folgt } x_2 = -6 + 8 = 2 \text{ und } x_3 = 3 - 8 = -5$$

Der gesuchte Punkt hat die Koordinaten $A(0|2|-5)$.

b) Abstand des Punktes $P(-3|-1|7)$ von g :

Ein „laufender Punkt“ auf g hat die Koordinaten $A(4 + t | -6 - 2t | 3 + 2t)$.

$$\text{Es gilt } \overrightarrow{PA} = \begin{pmatrix} 4 + t + 3 \\ -6 - 2t + 1 \\ 3 + 2t - 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 + t \\ -5 - 2t \\ -4 + 2t \end{pmatrix} \quad \text{Bedingung: } \begin{pmatrix} 7 + t \\ -5 - 2t \\ -4 + 2t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = 0$$

$$7 + t - 2 \cdot (-5 - 2t) + 2 \cdot (-4 + 2t) = 0$$

$$\Rightarrow 7 + t + 10 + 4t - 8 + 4t = 0$$

$$\Rightarrow 9t + 9 = 0 \Rightarrow t = -1$$

Der Lotfußpunkt hat die Koordinaten $A(3|-4|1)$.

$$\text{Der gesuchte Abstand beträgt } |\overrightarrow{PA}| = \left| \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ -6 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{36 + 9 + 36} = 9$$

Aufgabe 5:

- a) Damit die Gerade in E liegt, muss der Punkt $P(1/b/1)$ in der Ebene E liegen.

Einsetzen von $P(1/b/1)$ in die Koordinatengleichung: $2 \cdot 1 + 2 \cdot b + 1 = 5 \Rightarrow b = 1$

Der Richtungsvektor von g muss orthogonal zum Normalenvektor von E sein.

$$\text{Es muss gelten: } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow 2 + a = 0 \Rightarrow a = -2$$

$$\text{Gleichung der Geraden g: } \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

- b) Ein Punkt, der auf der Geraden h liegt ist $A(1/1/1)$ (Ortsvektor von g).

Der Richtungsvektor $\vec{u}$ von h muss senkrecht auf dem Richtungsvektor von g stehen.

Außerdem muss $\vec{u}$ auch senkrecht auf dem Normalenvektor der Ebene stehen.

$$\text{Somit gilt: } \vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Gleichung von h: } \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 6:

- a) Spurpunkte der Ebene E: $x_1 + 2x_2 - x_3 = 4$

$$S_1(x_1 / 0 / 0) \Rightarrow S_1(4 / 0 / 0)$$

$$S_2(0 / x_2 / 0) \Rightarrow S_2(0 / 2 / 0)$$

$$S_3(0 / 0 / x_3) \Rightarrow S_3(0 / 0 / -4)$$

Länge der Dreiecksseiten:

$$|\overline{S_1 S_2}| = \left| \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{16 + 4 + 0} = \sqrt{20}$$

$$|\overline{S_1 S_3}| = \left| \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{16 + 0 + 16} = \sqrt{32}$$

$$|\overline{S_2 S_3}| = \left| \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{0 + 4 + 16} = \sqrt{20}$$

Da zwei der drei Strecken gleich lang sind, ist das Dreieck gleichschenkelig.

b) Aus der Parameterform der Ebene F ergibt sich:

$$x_1 = -2 + 2r + s$$

$$x_2 = -2 + 3r + 2s$$

$$x_3 = 8r$$

Einsetzen der Koordinaten in die Koordinatengleichung:

$$-2 + 2r + s + 2 \cdot (-2 + 3r + 2s) + 8r = 4$$

$$\Rightarrow -2 + 2r + s - 4 + 6r + 4s - 8r = 4$$

$$\Rightarrow 5s = 10 \Rightarrow s = 2$$

Einsetzen von $s = 2$ in die Parameterform von F:

$$\text{Gleichung der Schnittgerade g: } \vec{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 7:

a) Für die Veranschaulichung der Ebene E benötigt man die Spurpunkte von


$$E: x_1 + 3x_2 = 6$$

$$\text{Schnittpunkt mit } x_1\text{-Achse: } S_1(6/0/0)$$

$$\text{Schnittpunkt mit } x_2\text{-Achse: } S_2(0/2/0)$$

Die Ebene schneidet die x_3 -Achse nicht (da in der Koordinatengleichung die Variable x_3 nicht auftaucht).

Die Ebene E ist daher parallel zur x_3 -Achse.



b) Koordinatengleichung von F: $2x_1 - x_3 = d$

$$\text{Einsetzen des Punktes } A(2/5/3): 2 \cdot 2 - 3 = d \Rightarrow d = 1$$

$$\text{Koordinatengleichung von F: } 2x_1 - x_3 = 1$$

Berechnung der Schnittgeraden ergibt sich durch das Lösen des folgenden Gleichungssystems:

$$\begin{array}{rcl} 2x_1 & -x_3 & = 1 \\ x_1 & +3x_2 & = 6 \end{array}$$

Setze $x_2 = t$ mit $t \in \mathbb{R}$

Aus der 2. Zeile folgt $x_1 + 3t = 6 \Rightarrow x_1 = 6 - 3t$

Aus der 1. Zeile folgt $2(6 - 3t) - x_3 = 1 \Rightarrow x_3 = 11 - 6t$

Gleichung der Schnittgeraden: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -6 \end{pmatrix}$

- c) Die gesuchte Gerade h ist eine Gerade, die parallel zur Schnittgeraden verläuft und einen Punkt enthält, der zwar auf E liegt, aber nicht auf F.
Solch ein Punkt wäre beispielsweise A(6/0/0).

Eine mögliche Gerade wäre also h: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -6 \end{pmatrix}$

Aufgabe 8:

- a) Es ist zu prüfen, ob ein Punkt der Gestalt P(p / p / p) auf g liegt.

$$\begin{pmatrix} p \\ p \\ p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{und daraus folgt} \quad \begin{array}{lcl} p & = & 3 + r \\ p & = & 4r \\ p & = & 1 + 3r \end{array}$$

Setze $p = 4r$ in die erste Zeile ein: $4r = 3 + r \Rightarrow 3r = 3 \Rightarrow r = 1$

Daraus folgt $p = 4 \cdot 1 = 4$

Test, ob die dritte Zeile stimmt: $4 = 1 + 3 \cdot 1$ ist wahr.

Damit liegt der Punkt P(4/4/4) für $r = 1$ auf der Gerade g.

- b) Um die Gleichung der Gerade h zu erhalten, benötigt man die Koordinaten des Lotfußpunktes L, wenn man vom Punkt Q aus ein Lot auf die Gerade h fällt.

Man geht so vor, wie wenn man den Abstand des Punktes Q von der Gerade g bestimmen möchte.

Der allgemeine Lotfußpunkt auf g besitzt die Koordinaten L(3 + r / 4r / 1 + 3r).

Der Vektor $\overrightarrow{QL} = \begin{pmatrix} -5 + r \\ 4r - 5 \\ -9 + 3r \end{pmatrix}$ steht orthogonal auf dem Vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$.

$$\text{Bedingung: } \begin{pmatrix} -5+r \\ 4r-5 \\ -9+3r \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = -5+r+4 \cdot (4r-5)+3 \cdot (-9+3r) = 0$$

$$\Rightarrow -5+r+16r-20-27+9r=0 \Rightarrow 26r=52 \Rightarrow r=2$$

Der Lotfußpunkt hat die Koordinaten L(5/8/7).

Die gesuchte Gerade h verläuft durch Q(8/5/10) und L(5/8/7).

$$h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 8 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 9:

Eine zu E parallele Ebene hat die Gleichung F: $4x_1 + 4x_2 + 7x_3 = c$

Hesse'sche Normalenform der Ebene F: $\frac{4x_1 + 4x_2 + 7x_3 - c}{\sqrt{16+16+49}} = 0$

Gesucht ist der Wert von c, so dass gilt: $d(O, F) = 2$ mit $O(0/0/0)$.

$$d(O, F) = \left| \frac{-c}{9} \right| = 2$$

$$1.\text{Fall: } \frac{-c}{9} = 2 \Rightarrow c = -18 \text{ also } F: 4x_1 + 4x_2 + 7x_3 = -18$$

$$2.\text{Fall: } \frac{-c}{9} = -2 \Rightarrow c = 18 \text{ also } G: 4x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 18$$

Aufgabe 10:


a) Schnittpunkte der Ebene E: $4x_1 + 3x_3 = 12$ mit den Koordinatenachsen:

$$S_{x_1}(x_1 / 0 / 0) = S_{x_1}(3 / 0 / 0)$$

$S_{x_2}(0 / x_2 / 0)$ existiert nicht, da dies auf einen Widerspruch $0 = 12$ führt

$$S_{x_3}(0 / 0 / x_3) = S_{x_3}(0 / 0 / 4)$$

Die Ebene ist folglich parallel zur x_2 -Achse.



b) Ein Punkt auf der x_3 -Achse hat die Koordinaten $P(0/0/a)$.

$$\text{HNF von E: } \frac{4x_1 + 3x_3 - 12}{5} = 0$$

$$\text{Einsetzen des Punktes P ergibt: } \left| \frac{3a - 12}{5} \right| = 3$$

$$\text{Fall 1: } \frac{3a - 12}{5} = 3 \Rightarrow 3a - 12 = 15 \Rightarrow a = 9 \Rightarrow P_1(0/0/9)$$

$$\text{Fall 2: } \frac{3a - 12}{5} = -3 \Rightarrow 3a - 12 = -15 \Rightarrow a = -1 \Rightarrow P_2(0/0/-1)$$

Aufgabe 11:


a) Berechnung der Seitenlängen des Dreiecks:

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ mit } |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{16 + 16 + 0} = \sqrt{32} \qquad \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ mit } |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{4 + 36 + 4} = \sqrt{44}$$

$$\overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ mit } |\overrightarrow{BC}| = \sqrt{36 + 4 + 4} = \sqrt{44}$$

Da zwei der drei Seiten gleich lang sind, ist das Dreieck gleichschenkelig.

b) Skizze:



Es gibt drei solcher Punkte.

$$\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ also } D(10/2/2)$$

$$\overrightarrow{OD^*} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 10 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ also } D^*(2/10/2)$$

$$\overrightarrow{OD^{**}} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{CB} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -6 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix} \text{ also } D^{**}(-2/-2/6)$$

Aufgabe 12:a) Schnittpunkte der Ebene E: $x_1 + x_2 = 4$ mit den Koordinatenachsen:

$$S_{x_1}(x_1 / 0 / 0) = S_{x_1}(4 / 0 / 0)$$


$$S_{x_2}(0 / x_2 / 0) = S_{x_2}(0 / 4 / 0)$$

 $S_{x_3}(0 / 0 / x_3)$ existiert nicht, da dies auf einen Widerspruch $0 = 4$ führt.Die Ebene ist folglich parallel zur x_3 -Achse.Schnittpunkte der Ebene F: $x_1 + x_2 + 2x_3 = 4$ mit den Koordinatenachsen:

$$S_{x_1}(x_1 / 0 / 0) = S_{x_1}(4 / 0 / 0)$$

$$S_{x_2}(0 / x_2 / 0) = S_{x_2}(0 / 4 / 0)$$

$$S_{x_3}(0 / 0 / x_3) = S_{x_3}(0 / 0 / 2)$$



Die Schnittgerade der Ebenen E und F ist die Gerade durch die Punkte $S_{x_1}(4/0/0)$ und $S_{x_2}(0/4/0)$.

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- b) Da die Ebene G parallel zur x_1 -Achse verläuft, taucht die Variable x_1 nicht in der Koordinatengleichung auf.

Ansatz für die Koordinatengleichung von G: $bx_2 + cx_3 = d$

Damit G dieselbe Spurgerade mit der x_2x_3 -Ebene wie F besitzt, muss G die Punkte $S_{x_2}(0/4/0)$ und $S_{x_3}(0/0/2)$ besitzen.

Einsetzen von S_{x_2} in die Koordinatengleichung: $4b = d$

Einsetzen von S_{x_3} in die Koordinatengleichung: $2c = d$

Wenn man z.B. $d = 4$ wählt, ergibt sich $b = 1$ und $c = 2$.

Eine mögliche Koordinatengleichung von G lautet damit: $x_2 + 2x_3 = 4$

Aufgabe 13:

Zunächst benötigt man die Gleichung der Geraden g.

$$\text{Es ist } g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Zur Berechnung des Abstandes von g zu Punkt C(2/3/1) benötigt man eine Hilfsebene H. Diese Hilfsebene steht orthogonal zur Geraden g und enthält den Punkt C. Der Normalenvektor von H ist der Richtungsvektor von g.

Normalenform von H: $\left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$

Koordinatengleichung von H: $-4x_1 + 3x_2 = 1$

Der Schnittpunkt von g mit H ergibt den Lotfußpunkt F:

$$-4(1-4s) + 3(10+3s) = 1 \Leftrightarrow -4 + 16s + 30 + 9s = 1 \Leftrightarrow s = -1$$

Einsetzen von $s = -1$ in die Gerade ergibt den Lotfußpunkt $F(5/7/1)$.

Abstand von g zu C = $\overline{CF} = |\overline{CF}| = \left| \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{9+16+0} = 5 \text{ LE}$

Aufgabe 14:

Der Normalenvektor von E_1 lautet $\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Die Ebene E_2 ist parallel zur Ebene E_1 , wenn $\vec{n}_1$ auch ein Normalenvektor von E_2 ist.

Dies ist dann der Fall, wenn der Vektor $\vec{n}_1$ orthogonal zu den beiden Richtungsvektoren der Ebene E_2 ist.

Kontrolle: $\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 - 2 = 0$ und $\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = 2 - 6 + 4 = 0$

Damit ist die Orthogonalität gezeigt. Somit sind die beiden Ebenen parallel.

Da die Ebene E_3 parallel zu den beiden anderen Ebenen sein soll, kann für diese Ebene

auch der Normalenvektor $\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ gewählt werden.

Um die Gleichung von E_3 aufzustellen, wird noch ein Punkt dieser Ebene bestimmt werden.

Ein (beliebiger) Punkt von E_1 lautet $A(0/0/-1)$.

Ein (beliebiger) Punkt von E_2 lautet $B(7/7/5)$.

Der Mittelpunkt M der Strecke AB liegt auf der Ebene E_3 .

Berechnung von M: $\overline{OM} = \frac{1}{2} \cdot (\overline{OA} + \overline{OB}) = \frac{1}{2} \cdot \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 7 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 3,5 \\ 3,5 \\ 2 \end{pmatrix}$, also $M(3,5/3,5/2)$

Eine Gleichung von E_3 lautet $\left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 3,5 \\ 3,5 \\ 2 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$.

Aufgabe 15:

Gleichung der Gerade g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$

Gleichung der Ebene E.

Da die Gerade g orthogonal zu E verläuft, ist der Normalenvektor von E der Richtungsvektor

von g: $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$

Ansatz für die Koordinatengleichung von E: $x_1 - 2x_2 - 3x_3 = d$

Einsetzen des Ebenenpunktes C(4/3/-8): $4 - 2 \cdot 3 - 3 \cdot (-8) = 22$ und damit ist $d = 22$

Koordinatengleichung von E: $x_1 - 2x_2 - 3x_3 = 22$

Schnittpunkt S von g und E:


$$(1+t) - 2(-1-2t) - 3(3-3t) = 22 \quad \Rightarrow 1+t+2+4t-9+9t = 22 \quad \Rightarrow 14t-6 = 22 \\ \Rightarrow t = 2$$

Einsetzen von $t = 2$ in die Geradengleichung liefert den Schnittpunkt S(3/-5/-3).

Kontrolle, ob der Punkt S zwischen A und B liegt:

Die Parameterform von g ist so aufgebaut: $\vec{x} = \vec{OA} + t \cdot \vec{AB}$

Da der Schnittpunkt S für $t = 2$ erreicht wird, gilt $\vec{OS} = \vec{OA} + 2 \cdot \vec{AB}$



Damit der Punkt S zwischen A und B liegt, müsste der Parameter t zwischen 0 und 1 liegen. Da $t = 2$ ist, liegt der Punkt S nicht zwischen A und B.

Aufgabe 16:

Zur Ermittlung der Schnittgeraden wird die Ebene E als Koordinatengleichung geschrieben.

E: $4x_1 - x_2 + 2x_3 = d$

Einsetzen von P(1/2/1) ergibt $4 - 2 + 2 = 4 = d$

Daraus folgt: E: $4x_1 - x_2 + 2x_3 = 4$

Berechnung der Schnittgeraden der beiden Ebenen:

Hierzu löst man folgendes Gleichungssystem:

$$\begin{array}{rrcr} 4x_1 & -x_2 & +2x_3 & = & 4 \\ & x_2 & +2x_3 & = & 8 \end{array}$$

Setze $x_3 = t$ mit $t \in \mathbb{R}$

Aus der 2. Zeile folgt: $x_2 + 2t = 8 \Rightarrow x_2 = -2t + 8$

Aus der 1. Zeile folgt: $4x_1 - (-2t + 8) + 2t = 4 \Rightarrow 4x_1 = 12 - 4t \Rightarrow x_1 = 3 - t$

Mit den Lösungen kann man nun die Gleichung der Schnittgerade g aufstellen:

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 3-t \\ -2t+8 \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 17:

a) Der Normalenvektor der Ebene E lautet $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Die zweite Koordinate des Normalenvektors (und damit das „Fehlen“ der Variable x_2 in der Koordinatengleichung zeigt, dass die Ebene E parallel zur x_2 -Achse ist.

Da zum Beispiel der Punkt P(0/1/0) nicht auf E liegt, wie man durch eine Punktprobe zeigen kann, liegt die x_2 -Achse nicht in der Ebene E, sondern ist „echt parallel“ zu ihr.

- b) Zur Ermittlung des Bildpunktes wird eine Hilfsgerade h aufgestellt, die senkrecht zu E (Richtungsvektor von h ist Normalenvektor von E) und durch den Punkt A verläuft:

$$h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Schnitt der Gerade h mit der Ebene E ergibt den Lotfußpunkt L:

$$1+r-(3-r)-4=0 \Rightarrow -6+2r=0 \Rightarrow r=3$$

Einsetzen von $r=3$ in die Geradengleichung ergibt L(4/1/0).

$$\text{Berechnung des Bildpunktes } A^*: \overrightarrow{OA^*} = \overrightarrow{OA} + 2 \cdot \overrightarrow{AL} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Die Koordinaten des Bildpunktes lauten $A^*(7/1/-3)$.

Aufgabe 18:

- a) E und g sind parallel, wenn der Normalenvektor von E und der Richtungsvektor von g orthogonal zueinander sind.

$$\text{Es gilt } \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} = 8 - 4 - 4 = 0 \text{ und damit sind die Vektoren orthogonal zueinander.}$$

- b) Der Abstand von E und g wird dadurch bestimmt, dass der Abstand des Geradenpunktes P(7/5/-7) zur Ebene E ermittelt wird.

Ebenengleichung als Koordinatengleichung: $8x_1 + x_2 - 4x_3 = d$

Punktprobe mit Ebenenpunkt B(-1/4/-3) ergibt $8 \cdot (-1) + 4 - 4 \cdot (-3) = 8 = d$

$$E: 8x_1 + x_2 - 4x_3 = 8$$

$$\text{HNF von E: } \frac{8x_1 + x_2 - 4x_3 - 8}{\sqrt{64 + 1 + 16}} = 0$$

$$\text{Einsetzen von P in die HNF von E: } d = \left| \frac{8 \cdot 7 + 5 - 4 \cdot (-7) - 8}{9} \right| = 9$$

Die Gerade von der Ebene den Abstand 9.

Aufgabe 19:

Zunächst wird anhand der 3 Punkte A, B und C die Parameterform einer Ebenengleichung aufgestellt:

$$E: \vec{x} = \overrightarrow{OA} + t \cdot \overrightarrow{AB} + r \cdot \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Nun wird mit Hilfe einer Punktprobe geprüft, ob der Punkt D auf dieser Ebene liegt.

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Aus der 3. Zeile folgt $t = 0,5$.

Aus der 2. Zeile folgt: $9 = 4 + 0,5 \cdot (-2) - 6r \Rightarrow r = -1$

Kontrolle mit 1. Zeile: $-1 = 2 + 0,5 \cdot (-2) + (-1) \cdot 2$ liefert eine wahre Aussage.

Damit liegt der Punkt D in der Ebene E.

Alle vier Punkte liegen somit in einer Ebene.

Hinweis:

Man hätte die Aufgabe auch anders lösen können:

Die vier Punkte A, B, C, D liegen in einer Ebene wenn die drei Vektoren $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ und $\overrightarrow{AD}$ linear abhängig sind. Wenn die Vektoren linear unabhängig sind, liegen sie nicht in einer Ebene.


Aufgabe 20:

$$\text{a) Aufstellen der Hesseschen Normalform von E: } \frac{3x_1 - 4x_3 + 7}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 0$$

$$\text{bzw. E: } \frac{3x_1 - 4x_3 + 7}{5} = 0$$

$$\text{Der Abstand von P zu E berechnet sich mit } d = \left| \frac{3 \cdot 9 - 4 \cdot 1 + 7}{5} \right| = 6.$$

Der Punkt P hat von der Ebene E den Abstand $d = 6$.



Zur Ermittlung der Koordinaten von Q muss die Geradengleichung nicht aufgestellt werden.

$$\text{Es gilt } \overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + 2 \cdot \overrightarrow{PS} = \begin{pmatrix} 9 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} -10 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Die Koordinaten von Q lauten Q(-11/6/1).

Aufgabe 21:


- a) Zur Veranschaulichung der Ebene müssen die Durchstoßpunkte von E mit den Koordinatenachsen berechnet werden:

Schnittpunkt mit der x_1 -Achse: $S_{x_1}(x_1/0/0) \Rightarrow S_{x_1}(4/0/0)$

Schnittpunkt mit der x_2 -Achse: $S_{x_2}(0/x_2/0) \Rightarrow S_{x_2}(0/4/0)$

Schnittpunkt mit der x_3 -Achse: $S_{x_3}(0/0/x_3)$:

Dies führt auf den Widerspruch $0 = 4$. Das heißt, dass dieser Schnittpunkt nicht existiert. Die Ebene E ist parallel zur x_3 -Achse.



- b) Zur Ermittlung der gegenseitige Lage der Gerade und der Ebene wird der Schnittpunkt von g und E berechnet.

Einsetzen der Zeilen der Parameterform von g in die Koordinatengleichung von E:

$$(1+r) + (3-r) = 4 \Leftrightarrow 4 = 4$$

Diese Gleichung besitzt unendlich viele Lösungen. Dies bedeutet, dass die Gerade g in der Ebene E liegt.

c) Hesse'sche Normalform von E: $\frac{x_1 + x_2 - 4}{\sqrt{2}} = 0$

Einsetzen des Ursprungs in die HNF ergibt den Abstand $d(O,E) = \left| \frac{0+0-4}{\sqrt{2}} \right| = \frac{4}{\sqrt{2}}$

Aufgabe 22:

Der Abstand der beiden Geraden ergibt sich aus dem Abstand des Punktes $P(2/9/4)$ auf der Geraden g von der Geraden h.

Aufstellen der Hilfsebene E, die den Punkt P enthält und senkrecht auf h steht:

E: $6x_1 - 8x_2 + 2x_3 = -52$

Schnitt der Ebene E mit der Geraden h:

$$6(1+6t) - 8(2-8t) + 2(5+2t) = -52$$

$$\Rightarrow 6 + 36t - 16 + 64t + 10 + 4t = -52 \Rightarrow 104t = -52 \Rightarrow t = -0,5$$

Schnittpunkt $S(-2/6/4)$

Der Abstand des Punktes S von P entspricht dem Abstand der beiden Geraden:

$$d(g,h) = |\overrightarrow{SP}| = \left| \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{16+9+0} = 5$$

Aufgabe 23:

Da die Durchstoßpunkte der Ebene E mit den Koordinatenachsen gegeben sind, kann die Koordinatengleichung direkt aufgestellt werden:

E: $4x_1 + 2x_2 + x_3 = 6$

(andere Möglichkeit: Aufstellen der Parameterform und Umwandeln in die Koordinatengleichung)

Die Gerade ist parallel zur Ebene E, wenn die Gerade und die Ebene keinen Schnittpunkt besitzt:

Berechnung des Schnittpunktes:

$$4(-4-2t) + 2(2+3t) + (3+2t) = 6$$

$$\Rightarrow -16 - 8t + 4 + 6t + 3 + 2t = 6 \Rightarrow -9 = 6$$

Dies ist ein Widerspruch, also existiert kein Schnittpunkt.

Damit ist die Gerade g parallel zur Ebene E.

Aufgabe 24:

Die Ebene E liegt in Parameterform vor, die Ebene F in Normalenform.
Zur Kontrolle, ob die Ebenen E und F parallel sind muss geprüft werden, ob die beiden Richtungsvektoren der Ebene E orthogonal auf dem Normalenvektor der Ebene F liegen.

$$\text{Es gilt: } \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 + 0 - 2 = 0 \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -2 + 2 + 0 = 0$$

Da sich jeweils als Skalarprodukt der Wert 0 ergibt, ist die Orthogonalität zwischen dem Normalenvektor von F und den Richtungsvektoren von E gezeigt. Also sind E und F parallel.

Der Abstand der beiden Ebenen entspricht dem Abstand des Punktes P(1/1/0), der auf der Ebene E liegt, von der Ebene F.

Dieser Abstand wird mithilfe der Hesse-Normalform ermittelt.

Umformung von F als Koordinatengleichung: F: $2x_1 + 2x_2 - x_3 = 8$

$$\text{HNF von F: } \frac{2x_1 + 2x_2 - x_3 - 8}{3} = 0$$

$$\text{Abstand P von F: } d(P, F) = \left| \frac{2 + 2 - 8}{3} \right| = \frac{4}{3}$$

Aufgabe 25:

a) Berechnung des Schnittpunktes von g mit E:

$$\begin{aligned} -2(2+t) + (-16+4t) - 2(2+t) + 15 &= 0 \Leftrightarrow -4 - 2t - 16 + 4t - 4 - 2t + 15 = 0 \\ \Leftrightarrow -9 &= 0 \end{aligned}$$

Es handelt sich um einen Widerspruch, also besitzt die Gerade g und die Ebene E keine gemeinsamen Punkte. Somit müssen sie parallel sein.

(Eine andere Möglichkeit wäre, die Orthogonalität des Normalenvektors von E und des Richtungsvektors von g nachzuweisen. Anschließend müsste noch gezeigt werden, dass die Gerade g nicht in der Ebene E enthalten sein kann, z.B. durch Prüfung, dass der Geradenpunkt P(2/-16/2) nicht in E enthalten ist).

b) Der Abstand der Geraden g von E kann dadurch berechnet werden, dass man einen beliebigen Punkt P der Gerade g wählt und dessen Abstand zur Ebene E ermittelt. Der Punkt sei P(2/-16/2) (Ortsvektor von g).

Berechnung der Hesse'sche Normalenform von E: $-2x_1 + x_2 - 2x_3 + 15 = 0$

$$\text{Es gilt } |\vec{n}| = \left| \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{4+1+4} = 3. \quad \text{HNF von E: } \frac{-2x_1 + x_2 - 2x_3 + 15}{3} = 0$$

$$d(P, E) = \left| \frac{-2 \cdot 2 + (-16) - 2 \cdot 2 + 15}{3} \right| = 3$$

Der Abstand von P zu E und damit auch von g zu E beträgt 3 Längeneinheiten.


Aufgabe 26:

Um die Ebenen zu zeichnen, sind die Durchstoßpunkte (Spurpunkte) mit den Koordinatenachsen erforderlich.

Die Durchstoßpunkte von E_1 haben die Koordinaten $S_1(3/0/0)$, $S_2(0/4/0)$, $S_3(0/0/6)$.

Die Durchstoßpunkte von E_2 haben die Koordinaten $S_1(2/0/0)$, $S_2(0/3/0)$.

Der Schnittpunkt mit der x_3 -Achse existiert nicht, die Ebene ist parallel zu dieser Achse.

**Aufgabe 27:**

Da die Gerade in der Ebene E liegt, kann sowohl der Ortsvektor als auch der Richtungsvektor der Geradengleichung für die Ebene übernommen werden.

Der zweite Richtungsvektor der Ebene ergibt sich aus dem Verbindungsvektor des Punktes

$$A(2/-1/-2) \text{ und des Geradenpunktes } B(3/3/1), \text{ also } \overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ebenengleichung } E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Umwandlung in Koordinatenform:

$$\text{Berechnung des Normalenvektors } \vec{n} = \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix} \text{ mit } \vec{n} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \text{ und } \vec{n} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = 0$$

Daraus ergibt sich das LGS:

$$\begin{aligned} n_1 + 4n_2 + 3n_3 &= 0 \\ 3n_1 + \quad \quad + 1n_3 &= 0 \end{aligned}$$

Das LGS besitzt unendlich viele Lösungen, es genügt, eine Lösung zu finden.

Setze hierzu z.B. $n_1 = 1$, dann ergibt sich $n_3 = -3$ und $n_2 = 2$, also $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Der Ansatz für die Ebenengleichung lautet E: $x_1 + 2x_2 - 3x_3 = c$

Den Wert von c erhält man, wenn man den gegebenen Punkt B(3/3/1) in die Ebene einsetzt:
 $1 \cdot 3 + 2 \cdot 3 - 3 \cdot 1 = 6$, also E: $x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 6$

Aufgabe 28:

Um zu prüfen, ob der Punkt A auf g liegt, wird eine Punktprobe durchgeführt:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Aus 3. Zeile: $2 = 0 + 2t \Rightarrow t = 1$

Aus 2. Zeile: $0 = 1 - t \Rightarrow t = 1$

Aus 1. Zeile: $3 = 1 + 2t \Rightarrow t = 1$

Alle 3 Zeilen liefern den gleichen Parameterwert, also liegt A(3/0/2) auf g.

g ist orthogonal zu E, wenn der Richtungsvektor von g ein Vielfaches des Normalenvektors von E ist.

$$\text{Richtungsvektor von g} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{Normalenvektor von E: } \vec{n} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Da $\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ist, sind die Vektoren Vielfache zueinander und somit sind g und E zueinander orthogonal.

Der Punkt auf E, welcher vom Punkt A den kleinsten Abstand hat, ist der so genannte Lotfußpunkt auf E. Hierzu stellt man die Gleichung einer Hilfsgeraden h auf, die durch A verläuft und orthogonal auf E steht. Die Hilfsgerade entspricht bereits der angegebenen Geraden g, da g wie oben gezeigt genau diese beiden Eigenschaften besitzt.

Anschließend wird diese Hilfsgerade mit der Ebene geschnitten, damit erhält man den Lotfußpunkt.

$$\text{Schnitt von g mit E: } 4(1+2t) - 2(1-t) + 4 \cdot 2t = 11 \Leftrightarrow 18t = 9 \Leftrightarrow t = 0,5$$

Einsetzung des t-Wertes in die Geradengleichung ergibt als Lotfußpunkt S(2/0,5/1).

S ist der Punkt auf E, der von A den kleinsten Abstand hat.

Aufgabe 29:

Die Durchstoßpunkte haben die Koordinaten $S_1(5/0/0)$, $S_2(0/4/0)$, $S_3(0/0/3)$.

Anhand der drei Punkte könnte man zunächst eine Parameterform aufstellen und diese in eine Koordinatengleichung umwandeln.

Da es sich hier um die Durchstoßpunkte mit den Koordinatenachsen handelt, geht es auch schneller. Der Hauptnenner der Werte 3, 4 und 5 ist 60. Diese Zahl steht auf der rechten Seite der Koordinatengleichung.

Die Koeffizienten vor den Variablen auf der linken Seite müssen nun so gewählt werden, dass die Punktkoordinaten die Ebenengleichung erfüllen.

Daraus ergibt sich: E: $\frac{60}{5}x_1 + \frac{60}{4}x_2 + \frac{60}{3}x_3 = 60$

Gesamtergebnis: E: $12x_1 + 15x_2 + 20x_3 = 60$